胃バリウム検査の流れ

約3分

スタート

❶ **発泡剤（白い粉末）を飲みます。**
胃でふくらみゲップが出やすくなりますが、検査終了までなるべくがまんしてください。
❷ **バリウムを飲みます。**
❸ **検査台が後ろにゆっくり倒れます。両側の手すりをしっかりにぎってください。**

1. あおむけ
右に２回まわる。
あおむけ

2. あおむけ
右に１回まわる。

3. あおむけ
右腰を浮かせて
体を斜めに

4. あおむけ
右に１回まわる。

5. あおむけ
左腰を浮かせて
体を斜めに

6. うつぶせ
うつぶせになって
手すりをしっかりと
にぎる。

7. うつぶせ
右腰を浮かせて
体を斜めに

8. うつぶせ
頭側が
下がるので、
肩あてに肩を押し
あてて、体を
しっかり支える。

9. うつぶせ
左腰を浮かせて
体を斜めに

10. あおむけ
右にまわって
あおむけに

11. 横向き
左腰を浮かせて
体を横に

12. あおむけ
ゆっくりと
あおむけに

13. 正面
検査台が起き上が
るので、足を台に
つける。

14. 横向き
右腰を浮かせて
体を横に

ゴール！！
以上で終わりです。
お疲れさまでした。
（しっかりと水分を
とってください）

検査順は変更になることがあります。

シオノギ製薬は、コミュニケーションバリアフリープロジェクトの活動を通して医療従事者と患者さまのコミュニケーションバリアの解消に取り組んでいます。

CBF コミュニケーションバリアフリー 気づきをカタチに、マイナスをプラスに

シオノギ製薬

協力 KKC 近畿健康管理センター

UD FONT 見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

責任編集：塩野義製薬 CBF-PJ
禁無断転載
© 2018 SHIONOGI

CBFPJ-K-002（A1）