

綜合維他命劑

“塩野義”維他命乙丙複合膠囊

B. C. CAP. “SHIONOGI”

人類在日常生活中，從食物攝取足夠的營養供給身體充分的能量，以維持生命活力。維他命是維持健康活力，同時促進發育與體格成長所必需的營養素。鈣質是骨骼與牙齒形成所必需之要素，也是保持神經系統與肌肉正常功能所必要的礦物質。這些維他命與鈣質需由食物中均衡攝取，但是有偏食、食物吸收利用不良、或者發育期、病中病後維他命需要量大增時，必須適當補給多種維他命與鈣質。

“塩野義”維他命乙丙複合膠囊是含人體日常生活營養補給所需要量之多種維他命，內含有維他命B₁、B₂、B₆、B₁₂、Nicotinamide、C、鈣質配合而成的綜合維他命製劑。

【成分】

每一膠囊中含有下列成分

Thiamine HCL (Vitamin B ₁)	10mg
Riboflavin (Vitamin B ₂)	5mg
Pyridoxin HCL (Vitamin B ₆)	5mg
Cyanocobalamin (Vitamin B ₁₂)	5μg
Calcium pantothenate	20mg
Nicotinamide	50mg
Coated Ascorbic acid (Vitamin C)	150mg
Calcium Phosphate Dibasic Anhydrous	204mg
(as Calcium)	60mg

賦形劑包含：Magnesium Stearate、Croscarmellose Sodium、Ethylcellulose、Wheat Starch

膠囊殼成分：Pharmaceutical Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、New Coccin、Brilliant Blue FCF、Titanium Dioxide

膠囊為全紅0號膠囊，膠囊上印有BC Cap字樣

【適應症】

發育不良、營養補給、虛弱體質、熱性消耗性疾患之補助治療、妊娠婦之營養補給。

【用法及用量】

醫師藥師藥劑生指示藥品。

1. 平日保持健康及預防維他命缺乏時，1日1顆，早或晚飯後服用。
2. 營養障礙時，1次1顆，1日2次，早或晚飯後服用。
3. 各種疾病之治療、妊娠、生產、授乳時等需要大量維他命時，1次1顆，1日3次，每餐飯後服用。(2顆以上服用者，於健康恢復後可減量1日1顆)
4. 6~15歲之兒童，請服用成人量之半(限1日1顆)。

【使用注意事項】

1. “塩野義”維他命乙丙複合膠囊是維持及增進健康、治療疾病之基本綜合維他命，可每天連續服用。(本劑無習慣性，按用法及用量服用也不會引起副作用)
2. “塩野義”維他命乙丙複合膠囊與醫師處方藥或其他治療劑及其他食物可以同時服用，必要時請與醫師或藥師商談用法及用量。
3. “塩野義”維他命乙丙複合膠囊充分提供保健或病中病後之營養補給所需之維他命與鈣質，不必再與他種類似之保健劑重覆使用。
4. 副作用：有下列異狀發生時，請中止投與。
 - (1)過敏症：偶有發疹、瘙癢感等過敏症狀發生。
 - (2)消化器：偶有食慾不振、胃部不快感、噁心、嘔吐、下痢等症狀發生。
5. 相互作用：有減弱 Levodopa 之作用。
6. Vitamin C 會影響臨床檢查值的正確性，如尿糖、尿、糞便潛血反應檢查。
7. “塩野義”維他命乙丙複合膠囊服用後小便若呈黃色，此乃維他命 B₂於體內被吸收代謝後部分排泄於尿中之故，不必掛心。
8. “塩野義”維他命乙丙複合膠囊因含有多種維他命，為保持品質，發揮效果，請注意下列各點：
 - (1)開封使用後請隨時將瓶蓋密栓。
 - (2)保存時應避免放置於日光直射之高溫高濕處，儘量放置於陰涼乾燥的地方。
 - (3)“塩野義”維他命乙丙複合膠囊遇水分時，會迅速崩散，如果水分附著於膠囊上，則會從其表面吸收水分產生變化，故請勿將膠囊放置於水分多的地方。
 - (4)為保證品質，開封後宜於 6 個月內服完。
9. 小兒服用時，請在雙親或保護者監督指導下使用。

【儲存方式】

請儲存於30°C以下

【包裝】

膠囊 2~1000 粒塑膠瓶裝。

委 託 者：台灣塩野義製藥股份有限公司



台北市南京東路二段 2 號 4 樓

電話：(02)25516336(代表號)

製 造 廠：台灣東洋藥品工業股份有限公司六堵廠



基隆市七堵區工建西路 5 號

電話：(02)24512466(代表號)

2IS02D001(A03)