

③

修訂日期：2015年8月


衛署藥製字第009792號

鎮 痙 劑

便治爾錠10毫克

BENTYL TABLETS 10mg

便治爾錠10毫克係含有如下記構造式所示之Dicyclomine hydrochloride的鎮痙劑。



Dicyclomine hydrochloride

Dicyclomine hydrochloride同時具有類似Atropine之向神經性及類似Papaverine之向肌性雙重鎮痙作用，前者係遮斷分布於消化管上之副交感神經末梢而使平滑肌鬆弛，後者則直接作用於平滑肌使之弛緩，故對平滑肌痙攣(疼痛)之緩解效果頗為特殊。

【成份】

1錠中含有Dicyclomine hydrochloride 10mg。
賦形劑包含：Lactose#200、Wheat Starch、Potato Starch、Magnesium Stearate、Purified Water、Hydroxypropyl Cellulose、Talc。

【適應症】

伴有平滑肌痙攣之諸疾患(胃腸管痙攣、膽囊、膽管痙攣及輸尿管之疾患)。

【效能】

作用於伴有平滑肌痙攣之下列機能疾患：

1. 伴有胃腸管痙攣之疾患。
食道·胃·幽門·十二指腸之痙攣、胃·十二指腸潰瘍引起之疼痛、憩室症及憩室炎、潰瘍性及痙攣性大腸炎、小兒疝痛、胃炎。
2. 膽石症及膽囊炎發生之疝痛。
3. 輸尿管之痙攣。

【用法及用量】

本藥須由醫師處方使用。

通常成人1次1~2錠，1日服用3~4次*。

*視症狀容易發作之時間，不妨於飯前、飯後、飯間或就寢時預先服用。

【使用注意事項】

1. 注意事項

(1) 本劑偶有引起睡意、視覺調節障礙之作用，應告知投與中之患者，在駕駛汽車等伴有危險性之機械操作上，倍加注意。

(2) FDA Pregnancy category(懷孕用藥級數)：B。

2. 禁忌

(1) 對前列腺肥大、閉尿、幽門狹窄等症之患者勿投與本劑。

(2) 小於6個月的新生兒，勿投與本劑。

(3) 青光眼患者，如有必要使用本劑時，應詳予診察，審慎投與。

3. 交互作用

本劑併用三環抗憂鬱劑(Tricyclic antidepressants)、苯噻嗪系藥劑(Phenothiazine)、單胺氧化酵素抑制劑(MAO inhibitor)等藥劑時，有相互增強作用。

4. 副作用

服用本劑有時會口渴，或偶見便秘、食慾不振、胃部膨滿感、噁心、嘔吐、眩暈、霧視、頭痛、皮疹、疲勞感、倦怠感、欣快感、心悸亢進、排尿障礙、陰萎等症狀，此時宜作減量、停藥或中止投與等適當處置為妥。

【儲存方式】

請儲存於30°C以下

【包裝】

6~1000錠塑膠瓶裝。

委託者：台灣塩野義製藥股份有限公司



台北市南京東路二段2號4樓

電話：(02)25516336(代表號)

製造廠：台灣東洋藥品工業股份有限公司六堵廠

基隆市七堵區工建西路5號



電話：(02)24512466(代表號)

2IS02D002(A03)