

120mm

120mm

③  
修訂日期：2016年3月

內衛藥製字第000230號

維他命B<sub>1</sub>衍生物  
**滋維達命**<sup>®</sup> 膠囊  
**DICETAMIN CAPSULES**

【組成】

1膠囊中含有Cetotiamine hydrochloride 50mg  
Cetotiamine hydrochloride (Dicethiamine hydrochloride)為白色的結晶或結晶類的粉末，通常無香味或散發淡淡的特殊香味，味苦。易溶於水、甲醇(Methanol)、乙醇、三氯甲烷(Chloroform)；稍溶於異丁醇(Isobutanol)；不易溶於醚(Ether)。熔點：約120°C (分解)。  
賦形劑包含：Lactose #100、Corn Starch、Talc、Magnesium Stearate  
膠囊殼成分：Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Titanium Dioxide、Tartrazine、Purified Water

【適應症】

Dicetamin capsules適用於維他命B<sub>1</sub>缺乏症及因維他命B<sub>1</sub>缺乏而產生之各種代謝性障礙。

【用法及用量】

本藥須由醫師處方使用。  
1. 維他命B<sub>1</sub>缺乏症之治療：通常成人1次1膠囊，1日1~3次，飯後服用。  
2. 各種代謝性障礙、諸疾患、諸症狀之治療：通常成人1次1~2膠囊，1日1~3次，飯後服用。  
3. 小兒依年齡、症狀適宜增減。

【藥物動力學】(依文獻刊載)

1. 體內藥物動力學  
(1)血中濃度：對健康成年男子10人經口投與1錠(Cetotiamine hydrochloride 25mg)，其最高血中濃度2個小時後約為30μg/dL。  
(2)代謝：經生物體內的加水分解酵素(Hydrolase)，轉化為Thiamine hydrochloride (Vitamin B<sub>1</sub>)，側鏈的Carboxyethoxyl基會變成乙醇和二氧化碳。  
(3)排泄：35S-識別體35.7mg (Thiamine hydrochloride 25mg (Vitamin B<sub>1</sub>)) 經口投與成人2人，其尿中排泄量在起初的1、2個小時內約為18~21%，24小時的平均尿中排泄量為40.4%。  
2. 非臨床實驗  
(1)毒性：

①LD<sub>50</sub>(mg/kg)對ddS系小白鼠進行靜脈注射=441.6；皮下=2315.3；經口投與=4000~8000。  
②對於生殖方面的影響：無導致畸形、胎兒致死之影響。  
(2)動物組織內分布：  
對於大白鼠等的生體組織細胞的親和性大，對肝、腎、肌肉等主要臟器有高濃度的移行效果；對於心臟、神經系也有顯著的增加。

【副作用】

消化器：偶有輕微的胃部不適、胸熱、下痢等症狀。

【儲存方式】

請儲存於30°C以下。

【包裝】

6~1000粒塑膠瓶裝。

180mm

委託者：台灣塩野義製藥股份有限公司  
台北市南京東路二段2號4樓  
電話：(02)25516336(代表號)

製造廠：台灣東洋藥品工業股份有限公司六堵廠  
基隆市七堵區工建西路5號  
電話：(02)24512466(代表號)



2IS01D005(A03)