

鎮咳祛痰劑

滅咳康[®] 糖漿MEDICON[®] SYRUP

【成分】

1. 組成	商品名	Medicon syrup
	有效成分及含量(1ml 中)	Dextromethorphan HBr 2.5mg Potassium cresolsulfonate 15.0mg
	其他成分(賦形劑)	Alcohol 95%、Sucrose Purified、Benzoic Acid、Caramel、Cherry Flavor、Sodium Hydroxide、Water Purified
2. 性狀	商品名	Medicon syrup
	性狀·劑型	為淡黃褐色、澄明之黏稠液體，帶有甘苦味及芳香氣味(糖漿型藥劑)
	pH	3.3~4.5

【用途(適應症)】

鎮咳、祛痰。

【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用：
 - (1) 曾因本藥成分引起過敏的人。
 - (2) 服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)或血清素回收抑制劑的抗憂鬱劑(SSRI)的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - (1) 3歲以下。
 - (2) 吸煙、氣喘、慢性阻塞性肺疾患(包括如慢性支氣管炎、肺氣腫)所引起之咳嗽、及伴有濃痰之咳嗽的人。
 - (3) 65歲以上之高齡者。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑生：
 - (1) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - (2) 同時服用抑制藥物代謝酵素(CYP2D6)之藥物：Quinidine、Amiodarone、Terbinafine。
- 其他使用上注意事項：
 - (1) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
 - (2) 為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (3) 避免陽光直射。
 - (4) 勿超過建議使用量。
 - (5) 不得與含酒精飲料併用。
 - (6) 使用前須振搖均勻，並使用所附量器量取藥量。
 - (7) 調劑時：與藥水一同使用時，如與碘化鉀、碘化鈉、氨、茴香精等配合使用時，會析出游離鹽基，故要避免與上述物質配合使用。
 - (8) 與苦味酞、橙皮酞等酞劑及可溶性苯巴比妥(Phenobarbital)等併用時，則會使濃度增加，因而產生生成沉澱的現象，請多加留意。

【用法用量】

年齡	每次服用量	一日服用次數
12歲以上	6mL	3次
6歲以上未滿12歲	3mL	
3歲以上未滿6歲	1.5mL	
3歲以下	請洽醫師診治	

【警語】

- 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹
神經系統	嗜睡、頭痛、眩暈、不適、失眠
消化道	噁心、嘔吐、食慾不振、便秘、腹痛、口渴、打嗝

- 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (1) 若有任何不適情況產生。
- (2) 有高燒、出疹、持續性頭痛、及持續達一星期以上之咳嗽、或有復發現象的人。
- (3) 呼吸抑制、過敏性反應症狀(呼吸困難、蕁麻疹、血管浮腫等)，如有此症狀出現時，請中止給藥。
- (4) 過量投與後發生嘔氣、嘔吐、尿滯留、運動失調、精神混亂、興奮、神經過敏、幻覺、呼吸抑制、嗜睡等症狀。


【有效成分及其物理化學性質】

1. 一般名：Dextromethorphan hydrobromide Hydrate
化學名：(9S, 13S, 14S)-3-Methoxy-17-methylmorphinan monohydrobromide monohydrate

分子式：C₁₈H₂₅NO · HBr · H₂O

分子量：370.32

化學構造式：



性狀：白色結晶或結晶性粉末。

極易溶於甲醇；易溶於乙醇(95)及冰醋酸(100)中；難溶於水。

融點：約 126°C。


分配係數：16.98 [pH=7, 1-Octanol/緩衝液]。

2. 一般名：Potassium cresolsulphonate

分子式：C₇H₇KO₄S

分子量：226.29

化學構造式：



性狀：白色結晶性粉末，無臭、味苦。

易溶於水或甲酸；難溶於乙醇(95)；幾乎不溶於乙醚。

【包裝】

6~400ml 塑膠瓶裝。

【儲存須知】

儲存方式：本藥品因遇光會出現褪色的現象，因此開封後每當使用完畢時，請確實將瓶蓋蓋緊並放入遮光的容器中，或是放置於暗處儲藏。

儲存溫度：請儲存於30°C以下。

【類別】

醫師藥劑生指示藥品。

委託者：台灣塩野義製藥股份有限公司

地址：台北市南京東路二段2號4樓

電話：(02) 25516336

製造廠：晟德大藥廠股份有限公司新竹廠

地址：新竹縣湖口鄉實踐路2號

電話：(03) 5981829

