

120mm

120mm

⑤
修訂日期：2017年10月

衛署藥製字第005051號

制 酸 劑
寧 適[®] 錠
NACID[®] TABLETS

【成分】

有效成分及含量(1錠中)：

合成水滑石 [Aluminum magnesium carbonate hydroxide tetrahydrate, synthetic (Synthetic hydrotalcite)] 500mg。

單次劑量之酸中和能力為24.0mEq以上，鎂含量18.86mEq。

其他成分(賦形劑)：Sucrose、Wheat Starch、Carboxymethyl cellulose Calcium、Magnesium Stearate、Talc、Peppermint Oil

【用途(適應症)】

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用：
 - (1)曾因本藥成分引起過敏的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - (1)3歲以下。
 - (2)消化道潰瘍的人。
 - (3)有腎臟疾病的人。
 - (4)腎衰竭病患(長期服用含鋁胃藥可能會導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症、透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用)。
- 有下列情形者，使用前請諮詢醫師藥劑生：
 - (1)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - (2)與其他藥品併用時。
- 其他使用上注意事項：
 - (1)為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (2)避免陽光直射。
 - (3)勿超過建議使用量。
 - (4)一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。
 - (5)制酸劑之錠劑應嚼碎後吞服。

【用法用量】

年齡	每次服用量	一日服用次數
成人及12歲以上	2錠	3~4次得於飯後或飯間或睡前或需要時嚼碎後吞服
6歲以上未滿12歲	1錠	
3歲以上未滿6歲	1/2錠	碎後吞服
3歲以下	請洽醫師診治	

【警語】

1. 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑生：

身體部位	副作用
胃腸道	便秘、噁心、嘔吐、腹瀉、腹脹、打嗝

2. 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
(1)若有任何不適情況產生。
(2)連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【產品說明與特長】

1. 本藥為制酸劑，其有效成分為合成水滑石 Synthetic hydrotalcite (Aluminum magnesium carbonate hydroxide tetrahydrate, synthetic)，能符合理想制酸劑之各種條件。
2. 有優良制酸作用
 - 速效性，且使胃內容變性。
 - 制酸效果確實，不易受其他物質影響。
3. 有抗胃蛋白酶(Pepsin)作用
在適於胃蛋白酶作用之酸度下(pH=4左右)能完全抑制胃蛋白酶之活性。
4. 副作用少
本藥在胃腸道不被吸收，且腹瀉、便秘之發生例很少。

【包裝】

12~1000錠塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。

【類別】

醫師藥劑生指示藥品。

【儲存方式】

請儲存於30℃以下。

委託者：台灣塩野義製藥股份有限公司



台北市南京東路二段2號4樓
電話：(02)25516336(代表號)

製造廠：台灣東洋藥品工業股份有限公司六堵廠



基隆市七堵區工建西路5號
電話：(02)24512466(代表號)



2IS01D012(A05)

180mm