

臨得隆®維 膚 軟膏 0.06%

RINDERON-VA CREAM 0.06%

醫師藥師藥劑生指示藥品

臨得隆維膚水溶性軟膏為白色，潤滑半固體。皮膚科外用腎上腺皮質賀爾蒙、抗生素複合製劑

1. 成分

1.1 有效成分及含量

有效成分及含量（1g中）為Betamethasone valerate 0.6mg及Fradiomycin sulfate 3.5mg（力價）。

1.2 其他成分（賦形劑）

Cetanol、Polyoxyethylene stearyl ether、White petrolatum、Liquid paraffin、Methylparaben、Butylparaben、Disodium edetate、Monobasic sodium phosphate、Phosphoric acid、Sodium hydroxide。

2. 用途（適應症）

濕疹及類似疾患、火傷、濕疹性外耳道炎、耳殼周圍炎、耳殼皮膚炎、手術創傷、進行性壞疽性鼻炎、鼻前庭及周圍炎。

3. 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

- 3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 3.1.2 曾對Streptomycin、Kanamycin、Gentamycin、Fradiomycin等胺基糖苷類抗生素及Bacitracin引起過敏的人。
- 3.1.3 Fradiomycin耐性菌或Fradiomycin非感受性菌引起之皮膚之細菌性感染症。
- 3.1.4 皮膚結核、單純疱疹、水痘、帶狀疱疹、種痘疹、未伴有似濕疹變化之白癬、皮膚念珠菌症。
- 3.1.5 鼓膜穿孔之濕疹性外耳道炎。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

- 3.2.1 有深部皮膚組織感染的人。
- 3.2.2 3歲以下。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

- 3.3.1 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 3.3.2 要使用於臉部。

3.4 其他使用上注意事項：

- 3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。
- 3.4.2 避免陽光直射。
- 3.4.3 勿超過建議使用量或使用次數。
- 3.4.4 本藥限於外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜（如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等），潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。
- 3.4.5 本藥勿使用於大面積之體表（以超過使用者的兩手掌面積為參考）。
- 3.4.6 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
- 3.4.7 使用本藥前應徹底洗淨雙手。
- 3.4.8 本藥不可連續使用超過7天。
- 3.4.9 皮膚的黴菌或細菌性皮膚感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。
- 3.4.10 小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。
- 3.4.11 臉部、腋下及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。

3.4.12 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立即以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。

3.4.13 使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。

3.4.14 請勿使用在患部以外，也勿當作預防使用。

3.4.15 若在停止使用本藥後數周（通常為兩周內）症狀復發，或症狀已緩解，但皮膚發紅、刺痛、灼熱感，可能為停藥症後群，請持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

4. 用法用量

1日1～數次塗敷患部。

5. 警語

5.1 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	搔癢等、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、瘡子、毛細管擴張。停藥症候群（使用本藥一段時間後，停藥時可能有發紅、灼熱或刺痛感、劇烈搔癢、脫皮、滲膿等相關副作用，且可能蔓延超出原本治療範圍）。
全身性	庫欣氏症候群（如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等）。繼發性腎上腺功能不足（如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等）。

5.2 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- 5.2.1 若有上述外之其他不適情況發生。
- 5.2.2 使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

6. 包裝

100公克以下鋁管裝。

7. 儲存方式

儲存於30℃以下。

8. 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品



SHIONOGI

藥商：台灣塩野義製藥股份有限公司

台北市南京東路二段2號4樓
電話：(02)25516336(代表號)

製造廠：杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號
電話：(03)9581101(代表號)

