

⑦

修訂日期：2025年3月

內衛藥製字第010577號

臨得隆® 乳膏

RINDERON® -V CREAM 0.06%

醫師藥師藥劑生指示藥品

臨得隆乳膏為乳膏用乾性雪花膏型之基劑。皮膚用腎上腺皮質荷爾蒙製劑。

1.成分

1.1有效成分及含量 (1g中) 為Betamethasone valerate 0.6mg (相當於Betamethasone 0.5mg)。

1.2其他成分 (賦形劑)：White vaseline、Liquid paraffin、Cetanol、Polyoxyethylene stearyl ether、Butylparaben、Methylparaben、Phosphoric acid、Sodium phosphate monobasic、Sodium hydroxide、Purified water。

2.用途 (適應症)

濕疹或皮膚炎。

3.使用上注意事項

3.1有下列情形者，請勿使用：

3.1.1曾因本藥成分引起過敏的人。

3.2有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

3.2.1有深部皮膚組織感染的人。

3.2.2 3歲以下。

3.3有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

3.3.1兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.3.2要使用於臉部。

3.4其他使用上注意事項：

3.4.1為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2避免陽光直射。

3.4.3勿超過建議使用量或使用次數。

3.4.4本藥限於外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜（如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等），潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。

3.4.5本藥勿使用於大面積之體表（以超過使用者的兩手掌面積為參考）。

3.4.6使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。

3.4.7使用本藥前應徹底洗淨雙手。

3.4.8本藥不可連續使用超過7天。

3.4.9皮膚的黴菌或細菌性皮膚感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。

3.4.10小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。

3.4.11臉部、腋部及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。

3.4.12癬類或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。

3.4.13請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立即以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。

3.4.14使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。

3.4.15請勿使用在患部以外，也勿當作預防使用。

3.4.16若在停止使用本藥後數周(通常為兩周內)症狀復發，或症狀已緩解，但皮膚發紅、刺痛、灼熱感，可能為停藥症後群，請持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

4.用法用量

塗於患部。

5.警語

5.1使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、瘰子、毛細管擴張。 停藥症候群(使用本藥一段時間後，停藥時可能有發紅、灼熱或刺痛感、劇烈搔癢、脫皮、滲膿等相關副作用，且可能蔓延超出原本治療範圍)。
全身性	庫欣氏症候群（如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等）。繼發性腎上腺功能不足（如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等）。

5.2使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

5.2.1若有上述外之其他不適情況發生。

5.2.2使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

6.包裝

100公克以下鋁軟管裝。

7.儲存條件

儲存於30°C以下。

8.類別

醫師藥師藥劑生指示藥品。



SHIONOGI

藥商：台灣塩野義製藥股份有限公司

台北市中山區松江路106號4樓B戶

電話：(02)25516336(代表號)

製造廠：杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

電話：(03)9581101(代表號)



10-1900-07